

Ambulante Cystoscopie

Om diagnostische reden zal U een cystoscopie ondergaan. Hierbij wordt meteen flexibele camera de blaas en het plaskanaal geïnspecteerd. Dit document beschrijft de belangrijkste wenken voor dit onderzoek

Vorbereitung

- Dit onderzoek start best met lege blaas. Ga dus plassen net voor het onderzoek. Vraag eerst na of er geen urinestaal moet afgegeven worden.
- Onze medewerker zal u begeleiden naar het onderzoeksklokaal al waar u de mogelijkheid heeft om u ontkleden.
- Bij elke cystoscopie wordt een steriele wegwerphoes gebruikt om infecties te voorkomen

Het onderzoek

- Het onderzoek wordt steeds door Uw uroloog uitgevoerd en duurt slechts enkele minuten.
- Het inbrengen van de camera is onaangenaam en kan licht pijnlijk zijn dit duurt slechts enkele seconden
- Lichte branderigheid tijdens het onderzoek is normaal, probeer u zo goed mogelijk te ontspannen

Na het onderzoek

- Na het onderzoek kan u een sterke plasdrang ervaren die vaak tot 30 minuten kan aanhouden.
- Soms is de urine bij de eerste plas wat bloederig
- Na het onderzoek zal onze medewerker voor u Monuril meegeven, dit dient u in te nemen ter preventie van een urineweginfectie als gevolg van ons onderzoek

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. S De Prycker

Dr. B De Troyer

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. H P Wynant