

Cystoscopie/blaasbiopten

Beste,

U onderging een cystoscopie (+/- afnemen van blaasbiopten) via het dagziekenhuis. Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de nazorg tijdens de komende dagen.

Normale zorgen

- De eerste dagen na de ingreep zal plassen wat pijnlijk zijn. Het is aangeraden om toch voldoende te drinken om de urine te verdunnen. Pijnstilling bestaande uit Dafalgan 1g (4 keer per dag) volstaat.
- De urine zal de eerste uren vaak rood aankleuren; dit is normaal.

Mogelijke problemen

- Plassen is telkens zeer bloederig (vergelijkbaar met rode wijn) met beginnende klontervorming. Dit komt uiterst zeldzaam voor.
Hiervoor neemt u best contact op met het secretariaat urologie (tel. 03 760 23 59).
Buiten de werkuren kan u op de spoedgevallenafdeling terecht (tel. 03 760 60 00).
- In de dagen na de ingreep neemt branderigheid tijdens het plassen eerder toe; tevens merkt u dat u zeer frequent moet gaan plassen voor telkens kleine hoeveelheden. Mogelijks wijst dit op een blaasontsteking; hiervoor contacteert u best uw huisarts. Na het afnemen van een urinecultuur kan dan antibiotica gestart worden.

Hoewel ernstige problemen uiterst zeldzaam voorkomen, kan u met deze ongemakken geconfronteerd worden. Uiteraard is deze lijst niet volledig en kan u bij twijfel steeds terecht op het secretariaat urologie. Aarzel niet om ons – bij voorkeur tijdens de diensturen – te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. S De Prycker

Dr. B De Troyer

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. H P Wynant