

Plaatsen SPS

Beste,

Heden werd een suprapubische blaassonde geplaatst. Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de zorgen de komende dagen.

Normale zorgen

Het is normaal dat u de eerste dagen pijn hebt in de onderbuik als gevolg van de ingreep. Er kan regelmatig bloed in de urine worden gezien. Ook kan de insteekplaats wondvocht vertonen de eerste weken na de plaatsing.

Er wordt best een verzorging met desinfectie en steriel kleefverband voorzien 3* per week. Dit gebeurt doorgaans door de thuisverpleging. Een attest hiervoor werd voor zien.

Uw sonde is verbonden met een opvangzak of met een katheterventiel. In geval van gebruik van een opvangzak, kan deze gelegegd worden via het ventiel onderaan de zak. Wekelijks wordt deze zak best vervangen. In het geval de sonde verbonden is met een katheterventiel om de blaas te ledigen wordt dit best elke 3-4 uur gedaan. In dit geval wordt 's nachts best een nachtzak aangehangen.

De sonde wordt gewisseld na 8 weken, dit gebeurt de eerste maal op de raadpleging urologie, nadien kan dit door de thuisverpleegster gebeuren mits voorschrift van uw uroloog.

Mogelijke problemen

Blaasontsteking: Ondanks alle voorzorgen kan een blaasontsteking na deze ingreep optreden, dit zal u merken aan toenemende klachten pijn in de onderbuik, zeer vaak aandrang om te plassen, eventueel koorts. In dit geval neemt u best contact op met de huisarts om een urinestaal te laten onderzoeken en gepast antibioticum te starten. Indien uw huisarts niet beschikbaar is kan u zich wenden tot het ziekenhuis.

Blaasspasmen: dit uit zich in urineverlies via de natuurlijke weg of via de insteekplaats van de sonde en voelt aan als 'plasdrang'. Hiervoor kan medicatie voorzien worden. U kan hiervoor terecht op de dienst urologie.

Bij vragen of problemen kan u steeds terecht op ons secretariaat (037602359) van 8u00 tot 18u00.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys Dr. S De Prycker
Dr. F Vanhaverbeke

Dr. B De Troyer
Dr. H P Wynant