

Neurostimulatie definitief

Beste,

U werd in dagverblijf opgenomen voor het plaatsen van een definitieve stimulator.

Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de nazorg tijdens de komende dagen. Van de verpleegkundige ontving u ook een door de dienst anesthesie opgesteld document over de pijnstilling.

Normale zorgen

- Het is normaal dat u enkele minuten na aanschakelen van de stimulator door de arts, niet meer voelt dat deze aanstaat. De stimulator blijft wel gewoon werken zonder dat u dit voelt.
- De operatiewonde werd gehecht met resorbeerbare hechtingen. Deze verdwijnen na 3-4 weken. Er werd een kleefverband op aangebracht en dit mag ter plaatse blijven. Eens het verband loskomt of te bevuild is met bloed, kan dit vervangen worden; dit hoeft enkel de eerste 5 dagen. Nadien is doorgaans geen verband meer nodig.
- Douchen met verband is toegestaan; na 5 dagen kan een douche ook zonder verband (eventueel kan u het wondje ontsmetten met isobetadine).
- Zwemmen en baden is tegenaangewezen de eerste week
- U krijgt 2 toestellen mee naar huis: een GSM toestel en een witte connector. Beide toestellen dienen maandelijks eens te worden opgeladen. Dit kan met behulp van dezelfde lader
- U heeft deze toestelletjes alleen maar nodig als u uw stimulator wil aan/af zetten of wil verhogen/veranderen van programma. Het is dus geen enkel probleem dat uw GSM toestel en de witte connector in tussentijd volledig plat zouden zijn. U hoeft deze ook niet overal mee te nemen.
- Het is belangrijk dat, wanneer u een MRI scan nodig heeft, wordt geopereerd of door de metaaldetector moet (bvb op de luchthaven), u uw stimulator afzet (en nadien ook weer terug aanzet)
- Bijhorend in uw doos, zit een kaartje, dat bewijst dat u een stimulator heeft. Bewaar dit best in uw portefeuille.

Problemen

1. *Nabloeding*

- Er komt nog rood bloed uit het verband gesijpeld: dit is niet echt verontrustend. IJsapplicatie en eventueel lichte druk met een compressie gedurende 15 minuten kan dit stelpen. Dit mag eventueel herhaald worden.
- Bij aanhoudend bloedverlies, neemt u best contact op met het secretariaat urologie. (tel. 03 760 23 59) Buiten de werkuren kan u op de spoedgevallenafdeling terecht. (tel. 03 760 60 00).

2. *Infectie*

- Roodheid en zwelling ter hoogte van de naad zijn onmiddellijk postoperatief nog normaal. Doch als deze toenemen en de pijn verergert, kan dit wijzen op een wondinfectie. U raadpleegt hiervoor best uw huisarts.

Hoewel ernstige problemen uiterst zeldzaam voorkomen, kan u met deze ongemakken geconfronteerd worden. Uiteraard is deze lijst niet volledig en kan u bij twijfel steeds terecht op het secretariaat urologie. Aarzel niet om ons – bij voorkeur tijdens de diensturen – te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. S De Prycker

Dr. H P Wynant

Dr. B De Troyer